EMYS SCABRA, *Linn.*

Capite nigricante, supernè fasciis duobus, posticè divergentibus—supra nasum atque occiput maculis binis—omnibus rubris, ornato. Testâ oblongâ, convexâ, carinatâ, fusco nebulosâ.

Testudo punctularia. Daud. Rept. II. p. 349.
Testudo (Chersine) punctularia. Merrem, Amph. p. 29.
Emys punctularia. Schweig. Prod. sp. xix.—Gray, Syn. Rept. 25.
Junior. Sebæ Thes. I. t. lxxix. f. 1. 2. p. 126?—Gronov. Zoophyl. n. 74. p. 17.
Testudo scabra. Linn. Syst. Nat. 351?
La Raboteuse. Lacép. Quad. Ovip. t. x. p. 161.—Daubent. Enc. Méth.
Testudo scabra. Latr. Hist. Nat. Rept. I. p. 148.—Daud. Rept. II. 129.
Testudo dorsata. Schœpff, Test. p. 136.
Emys dorsualis. Spix, Rept. Braz. p. 11. t. ix. f. 1. 2.
Emys scabra. Gray, Syn. Rept. p. 24.

Habitat in Americâ meridionali.
Mus. nostr.

Descriptio. *Caput* mediocre, subacutum, nigrum, suprà fasciis duabus anticè unitis, postice divergentibus—maculis binis super nasum, et totidem super occiput—lineolis etiam pluribus lateralibus pone oculos—omnibus rubris, post mortem pallescentibus. *Mandibulæ* rubescentes. *Collum* longum, extensile, rugosum, granulosum, suprà nigricans, lineolis luteis, punctatis; subtùs flavescens. *Pedes anteriores* anticè lutei nigro punctati, posticè fusci, squamosi, squamis exterioribus majoribus. *Pedes posteriores* nigri, squamis parvis tecti. *Ungues* parvi, breves. *Cauda* brevis, triangularis, granulosa. *Testa* ovato-oblonga, anticè truncata, posticè subacuta, convexa, in medio excelsè carinata, margine ad latera revoluto, posticè subdentato. *Scuta* fusca, nebulosa, obscurè sulcata, rugosa, lineis punctato-elevatis ab areolarum angulis usque ad marginem scutorum radiantibus, areolis granulosis, scabris: *vertebralia* omnia carinata, areolis posticis; primum pentagonum; secundum et tertium quadrata vel subhexagona; quartum hexagonum, posticè angustius; quintum minimum pentagonum: *costalia* declivia, areolis prope marginem posteriorem positis; primum subtri-